



# DENTISTREE DENTAL CLINIC

Patient File No	:	580			
Patient Name	:	Maryam Adil Ahammad	DOB	:	21-Oct-2015
Nationality	:	Indian	Gender	:	Female
Emirates ID	:	784-2015-9169419-1	Date	:	24-Feb-2024

## Surgery & Tooth Extraction

## الجراحة و خلع الأسنان

Extraction and surgeries are the last course of action any dentist would choose but some teeth are beyond repair. The patient is anaesthetized for the procedure; after the procedure the patient may experience numbness or loss of feeling in the tongue, lips, teeth or surrounding structures (Paresthesia) that may last for an indefinite period of time (days or months). In some cases pharmacological treatment may be needed prior, during, and after the extraction this is why the patient must disclose his/her full medical status before proceeding with the treatment or else drug interaction or allergy may arise. If he/she fails to do so he/she are responsible for any financial, medical, legal or moral liabilities. The procedure is relevantly easy but in some cases due to the complicated root morphology or shape the root tip may fracture or dislodge into the sinus thus requiring surgical procedure to remove it or in some cases it may be left embedded in jaw bone. Teeth indicated for extraction are sometimes accompanied with abscesses that require surgical drainage. Any further treatment happens unexpectedly to the treatment plan for any reason, would be subject to additional cost which the patient has to pay, and would require extra treatment time and extra sessions. In some cases, the tooth is attached to the bone firmly or embedded in bone rendering simple extraction almost impossible thus requiring a more complicated surgical procedure which may include incisions, removal of surrounding bone and suturing the wound. During the procedure the adjacent teeth may be loosened or in some cases their fillings or the tooth itself might fracture. In some cases, extraction may lead to jaw fracture. In some cases, the patient may be hospitalized due to complications. Following the doctor's post-operative instructions is imperative to ensure that no complications occur. It is fairly common for the face to swell bruises to appear or limited jaw opening to occur or numbness of the lips after extraction and for the patient to experience some post-operative pain for the following 2-3 days or longer. If the pain increases the patient must return to the doctor to check the wound's status looking for dry socket or infection. The method of treatment is decided by the treating dentist's judgment and the position and condition of the tooth. As for children the same rules, precautions and procedures apply.

أو خلع السن هو آخر حل يقترحه الطبيب. بعض الأسنان لا يمكن خلال عملية الخلع يتم تخدير المريض ومن بعدها يمكن للمريض أن بعض الأسنان و اللسان و الشفة و المنطقة المحيطة بالسن لفترة غير (بهر). في بعض الأحيان قد يحتاج المريض لأخذ بعض الأدوية قبل أو ج لذلك على المريض الإفصاح عن حالته الصحية بالتفصيل لتجنب و أي تفاعل غير مرغوب مع الأدوية الأخرى، وفي حال عدم إفصاحه نية يتحمل هو و هو وحده المسؤولية المالية او الطبية او القانونية او . العملية سهلة بشكل عام لكن في بعض الأحيان بسبب شكل الجذر رأس الجذراو يزاح للجيوب و قد يحتاج لتدخل جراحي لإزالته أو في ن تركها في مكانها بالعظم. الأسنان التي يتم خلعها في بعض الأحيان تراج الذي قد يحتاج لتفريغ جراحي، أي علاج آخر يطرأ على خطة فله تكلفة إضافية يجب على المريض دفعها ويتطلب وقت ومواعيد هنس الأحيان يكون السن شبه ملتصق بالعظم أو مطمور مما قد يحول حة تتطلب شق لثة و إزالة بعض العظم المحيط و من ثم تقطيب ية الخلع قد تتحرك الأسنان المجاورة للسن المتضرر أو في بعض السن أو الحشوة في السن المجاور. و قد ينكسر الفك خلال عملية خال المريض للمستشفى في حال حدوث أي مضاعفات. إتباع أوامر لتجنب أي مضاعفات بعد العملية. إنتفاخ أو تبقع الوجه و عدم فتح ير الشفاه و الإحساس ببعض الألم أمر إعتيادي لبضعة أيام أو لفترة لألم فعلى المريض مراجعة الطبيب للتحقق من الأمر و التأكد من عدم طريقة الخلع يتم تحديدها من قبل الطبيب المعالج بما يتناسب مع مية للأطفال فنفس الشروط و المحاذير و طرق الخلع تطبق.

العلاج يجب أن تدفع مقدما بالكامل و هي غير مرتجعة في أي مرحلة حتى و لم يكمل المريض العلاج لأي سبب.

ض على تغيير خطة العلاج بما يتعارض مع نصائح الطبيب فعليه هو او إل عنه التوقيع على التعهد الخاص بذلك والذي يعنى عيادة عيادة و أطبائه وبشكل كامل من أي مسؤولية مالية أو طبية أو قانونية أو

بالمواعيد المحددة له أو تعليمات الأطباء قد يؤدي إلى مضاعفات قد أو تؤدي إلى فشلها و في هذه الحالة يتحمل هو وحده تكلفة خطة نفق عليها إضافة إلى التكلفة الإضافية الناتجة من تعديل خطة العلاج ، أيضا أي مسؤولية أخرى دون تحمل عيادة عيادة دينتاستري للسنان لية مادية أو طبية أو مغنوية أو قانونية مها كانت.

ن هو مسؤول عنه أو يمثله على هذه الورقة يعني أنه;

ها وقيل بها و أستفسر بشكل كامل ويرضيه كل ما يتعلق بالعلاج من