

Patient File No

427

**Patient Name** 

Tisha Jain

Nationality

Indian

**Emirates ID** 

784-2011-3957093-7

DOB

19-Feb-2011

Gender

Female

Date

25-Mar-2024

## Surgery & Tooth Extraction

## الجراحة وخلع الأسنان

•

أو خلع السن هو آخر حل يقترحه الطبيب: بعض الأسنان لا يمكن . خلال عملية الخلع يتم تحدير المريض ومن بعدها يمكن للمريض أن بعض الأسنان و اللسان و الشفة و المنطقة المحيطة بالسن لفترة غير شهر). في بعض الأحيان قد يحتاج المريض لأخذ بعض الأدوية قبل أو ج لذلك على المريض الإفصاح عن حالته الصحية بالتفصيل لتجنب و أي تفاعل غير مرغوب مع الأدوية الأخرى, وفي حال عدم إفصاحه عن يتحمل هو وهو وحده المسؤولية المالية أو الطبية أو القانونية أو . العملية شهلة بشكل عام لكن في بعض الأحيان بسبب شكل الجذر رأس الجدراو يزاح للجيوب و قد يحتاج لتدخل جراحي لإزالته أو في ن تركها في مكانها بالعظم. الأسنان التي يتم خلعها في بعض الأحيان براج الذي قد يحتاج لتفريغ جراحي. أي علاج آخر يطرأ على خطة فله تكلفة إضافية يجب على المريض دفعها ويتطلب وقت ومواعيد مض الأحيان يكون السن شنبة ملتصق بالعظم أو مطمور مما قد يحول حة تتطلب شق لثة و إزالة بعض العظم المحيط و من ثم تقطيب ة الخلع قد تتحرك الأسنان المجاورة للسن المتضرر أو في بعض الأحيان الحشوة في السن المجاور. و قد ينكسر الفك خلال عملية الخلع . قد ، للمستشِّفي في حال حدوث أي مضاعفات. إتباع أوا مر الطبيب أمر مضاعفات بعد العملية. إنتفاخ أو تبقع الوجه وعدم فتح الفم بأكمله و صاس ببعض الألم أمر إعتيادي لبضعة أيام أو لفترة أطول. في حال زاد م مراجعة الطبيبة للتحقق من الأمر و التأكد من عدم وجود أية خلع يتم تحديدها من قبل الطبيب المعالج بما يتناسب مع حالة يُطفَّال فنفس الشروط و المحادير وطرق الحلَّع تطبق.

، العلاج يجب أن تدفع مقدما بالكامل و هي غير مرتجعة في أي مرحلة عق و لم يكمل المريض العلاج لأي سبب.

ص على تغير خطة العلاج بما يتعارض مع نصائح الطبيب فعليه هو او بل عنه التوقيع على التعهد الخاص بذلك والذي يعني عيادة عيادة و أطبائه وبشكل كامل من أي مسؤولية مالية أو طبية أو قانونية أو

، بالمواعيد المحددة له أو تعليمات الأطباء قد يؤدي إلى مضعفات قد ي تؤدي إلى فشلها و في هذه الحالة يتحمل هو وحده تكلفة خطة العلاج لميها إضافة إلى التكلفة الإضافية الناتجة من تعديل خطة العلاج كما نما أي مسؤولية أخرى دون تحمل عيادة عيادة دينتاستري للسنان أو مادية أو طبية أو معنوية أو قانونية مها كانت.

ن هو مسؤول عنه أو يمثله على هذه الورقة يعني أنه:

ف الما العلام من اطباء ف الما من اطباء

Extraction and surgeries are the last course of action any dentist would choose but some teeth are beyond repair. The patient is anaesthetized for the procedure; after the procedure the patient may experience numbness or loss of feeling in the tongue, lips, teeth or surrounding structures (Paresthesia) that may last for an indefinite period of time (days or months).In some cases pharmacological treatment may be needed prior, during, and after the extraction this is why the patient must disclose his/her full medical status before proceeding with the treatment or else drug interaction or allergy may arise. If he/she fails to do so he/she are responsible for any financial, medical, legal or moral liabilities. The procedure is relevantly easy but in some cases due to the complicated root morphology or shape the root tip may fracture or dislodge into the sinus thus requiring surgical procedure to remove it or in some cases it may be left embedded in jaw bone. Teeth indicated for extraction are sometimes accompanied with abscesses that require surgical drainage. Any further treatment happens unexpectedly to the treatment plan for any reason, would be subject to additional cost which the patient has to pay, and would require extra treatment time and extra sessions. In some cases, the tooth is attached to the bone firmly or embedded in bone rendering simple extraction almost impossible thus requiring a more complicated surgical procedure which may include incisions, removal of surrounding bone and suturing the wound. During the procedure the adjacent teeth may be loosened or in some cases their fillings or the tooth itself might fracture. In some cases, extraction may lead to jaw fracture. In some cases, the patient may be hospitalized due to complications. Following the doctor's post-operative instructions is imperative to ensure that no complications occur. It is fairly common for the face to swell bruises to appear or limited jaw opening to occur or numbness of the lips after extraction and for the patient to experience some post-operative pain for the following 2-3 days or longer. If the pain increases the patient must return to the doctor to check the wound's status looking for dry socket or infection. The method of treatment is decided by the treating dentist's judgment and the position and condition of the tooth. As for

children the same rules, precautions and procedures apply.

In caca the nations account